

*In brachio.**Sectione speculandi negligenter.**Manus exco-  
natio.**Musculi la-  
tescentem ten-  
dinem educentis  
administratio.**Lib. de Ad-  
mi. sectio.*

cipium iunxeris, uniusque musculi loco habueris, octo erunt, nam bis unum, ubi nos duos con-  
stitimus, recenses. In anteriori brachij sede \* duo flectentes cubitum sunt, in posteriori au-  
tem sede extendentes, aut tres, aut duo, aut unus, pro ratione nimirum collectionis in pau-  
ciores, uel distributionis in plures, quam tuo arbitratu proponere nihil obstat, si modò accu-  
ratè illorum situm, connexum, amplitudinem, compositionem, functionem, & id genus alia  
secando didiceris. Quippe ridiculum est de numero anxium esse, quamquam in publicis sectio-  
nibus, quum huius aut illius articuli musculos ita ostendi, ut nò minùs quam proprii unguis  
cognosci possint, perpauci studiosorum aliud recensere ualeant, quàm hac prælectione qua-  
draginta ostensos esse musculos. id satis arbitrati, si numero condiscipulum deterreant, nego-  
cijque difficultatem, & me unica ostensione nimium multa aggredientem incusent. In hoc ta-  
men, qui inter illos diligentiores uideri uolunt, sedulo student, ut in quibus à Galeno dissen-  
tiam, sæpe quid uelim, non intelligentes excipiant & ad hos & illos ipsis indolentiores transcri-  
bant. Quo labore ut ipsos liberem, hæc à me toties efflagitata candidiori animo, quàm à ple-  
risque accipienda erunt, describere ne utique grauior: unumquemque amicè monens, ne quis  
huic libro, neque alteri cuiquam, utcunque uetustate autoritateque probato fidem præbeat, nisi  
accuratissima sectione, quæ scribuntur, prius, idque non semel inspexerit. Porro hanc, brachio  
eius quod secas, cadaueris assumpto, ad hunc modum in manus musculis administraturus es.  
Primum cutem cum adipe & membrana, quam carnosam uocare libuit, adimes: atque id per-  
feceris comino dissimè, si ab externa brachij sede, secundum radij ductum, & pollicis exteriora  
sectionem duxeris, quæ cutem membranamque carnosam diuidat. Dein ad cuiusque digitila-  
tus alia ducenda est sectio, quæ depilem (ut sic dicam) manus cutem, ab exteriori dirimat, ut illa  
cum brachij & cubiti cute auelli queat, ea quæ internam summæ manus sedem integit, adhuc  
relicta. Neque in cute adimenda nunc alio indiges artificio, quàm quo lanij boues exco-  
rant. Quum tamen ad radicem brachialis, in interna manus sede peruentum fuerit, transuersa sectione  
cutem nunc liberatâ ab illa, quæ in uola adhuc reliqua est, rescabis. hæc namque latefcentis \* ten-  
dinis nomine asseruanda uenit. Priusquàm uerò tendinē illum aggrediaris, accuratè perpendito,  
totam cubiti sedem paulò minus toto liuescentem, ob membranam quæ musculis proximè  
adnata, illos inuicem committit, atque ne ipsi sua sede declinent, amplectitur. In conspectum  
enim cubitum occupantes musculi iam ueniunt, sed ita commissi, ut solum lineas, quæ ipsos di-  
rimant, intuearis: quum tamen mutuo prorsus distincti apparebunt, si leues duntaxat sectiones  
secundum dictas modò lineas duxeris. Huius membranæ naturam eo obseruabis diligentius,  
quo magis perfunctoriè, imò nihil prorsus Anatomici illius meminerint. Cæterum ut latefen-  
tem uideas tendinem, animum accommoda cubiti internæ sedi, in cuius longitudine ipsius mu-  
sculus, & tendo, quum adhuc gracilis est, exporrigitur. Cultello itaque à brachialis radice sectio-  
nem leuem, ad tendinis & musculi latus utrinque, uersus internum humeri tuberculum mo-  
ueris, & postmodum iuxta brachiale, tendinem à sublati organo liberabis, & cultello transuer-  
sim ipsi subiecto, & sinistrae manus digitis tendine eleuato, uniuersum musculum ad ipsius ul-  
que caput separabis. Deinceps acutiori nouacula cutem manus adhuc reliquam, à uola & digi-  
tis absciccare conator, à brachiali sectiones semper transuersas molitus, eadem omnino ratione,  
qua cutem à carnea membrana diuidere iam dudum assueuisti. Quemadmodum enim in illa  
sectione membranam corpori affixam seruas, ita quoque tendinem dilatescentem manu iam  
hære finis. Quum uerò id tentas, duriusculus sese offeret adeps, cutem & tendinem illum inter-  
cedens, qui tanto diligentius quoque animaduertendus est, quanto tendinem magis à cute diri-  
mit: & tendinem non toti cuti proximè adnatum, sed duntaxat fibrosis nexibus membranæ  
carnosæ modo, & adipis interuentu, pertinacissimè commissum ostendit. Examinaute, mu-  
sculi caput ab humero liberatum, à brachiali pendere sines latefcentem tendinem, à subditis  
quoque aut nouacula, aut paruo, sed acutiori cultello auulsurus. Si uerò aliquando uisum  
fuerit, tendinem unà cum cute adimere, id feceris facillimè, si tendinem priusquam cutem se-  
paras, unà cum cute abstuleris. at tunc arduum erit, tendinem à cute integrum liberare: quam-  
uis non adeò, ut Galenus arbitratus est, qui nihil medium inter cutem & tendinem posuisse  
uidetur. Porro si hic musculus in interna cubiti sede sese non offerat, atque \* duorum musculo-  
rum, qui brachiale flectunt, capitibus ad humeri interius tuberculum, nullum musculum in-  
cumbere uideris, præsentem musculum deesse cōiicito: quod sanè non infrequenter tibi occur-  
surum scio. Nò quòd negligentia illum præteriturus sis, uerum quòd prorsus deerit, eius uicem  
tunc supplente inferiori, interdum etiā superiori brachiale flectentiū musculo, aut transuersi  
in brachiali ligamenti portione, quam pari modo ut latum tendinē indagabis. Iam itaque omnia  
cute libera sunt, unde etiam & quosdā extremæ manus musculos citra aliam sectionem aggredi  
possis,

possis, eum uidelicet \* qui pollicem à reliquis digitis  
num ipsius internodiū flectentes, sic & \* musculum  
maximè abducitur, & \* exteriorem primum eius d  
portuniùs feceris, si donec omnes summæ manus  
ad internam cubiti sedem te rursus contuleris, in qu  
chiale flectentes, quos rectissimè primum ab ipso  
gredieris. Si enim hos à subditis musculis aliquanti  
lis sectionibus, illos ad internum usque humeri tul  
iporum ferè naturum mediocri negotio spectabis.  
lo ab ulna liberato, ut is duntaxat ab insertione \* de  
aut adhuc appensum sines. Superioris autem tend  
musculus suo liberatus capite, in latus est reponend  
nit rescandus, ut in sectionis serie, eius tendinis inf  
gitus mouentium sese totus offert, quem uel solis o  
etiam omnes, quorum latera non committit neruo  
timunere fungitur. Vbi itaque ipsius capite adhuc  
te brachiale carnosas portiones inspexeris, ualidus  
etā est iniiciendus, ut huius acie antrorsum ducta, i  
tione secundum indicis longitudinem, transuersum  
mentem accommodans, ne hæc proropes tendinē  
do cultelli dorsum semper tendines respiciat, ipseque  
bus reliquis digitis moliri in præsentia posses, nisi i  
naturam aut discere, aut alijs ostendere propositum  
uis digito hac ducta sectione, primi musculi digito  
henso, & ad te sursum tracto, id ex brachialis sinu ta  
tendines ad quatuor digitos porrigi conspexeris, &  
nem obseruaueris, qui indici exporrigi. Hæc enim  
reposito, eius caput trahendū uenit, ut ipsius innote  
indici articulo in flexu secūdi, tendo ille adniti noli  
tis inuoluti innituntur, proximè ue attenduntur. Nu  
ac cuiusque tendinis insertionem & perforationem, qua  
musculum à manu in anteriora reflexum mensæ ex  
propendere à digitis sines, ac \* eum qui tertium qu  
capite liberabis, quod nō nihil occultitur sub muscu  
cente. Priusquam tamen id ab ulna abradas, cōducent  
attollere, & animum adhibere, quū citra omnem o  
ab \* illo diuellatur, qui ipsius superiori lateri accum  
tur adeo, ut utrumque musculi unius loco in homin  
musculi capite & ipsius quoque exortu, quem ab  
diūm & ulnam, ubi inuicem hæc ossa dehiscunt, obu  
sinu repones, eius mucosam perpendens membranā  
tamen est, ne quum eos attollere studes, gracilem \*  
ctum uiolos, hic enim quum tendini committitur, at  
rium usque articulum secundi musculi tendines osci  
dines \* primi musculi tendinibus traici atque in terti  
suum locum reposito, examinaturus num secūdi mu  
soli, aut simul cum ipsis primi musculi tendines, & ei  
lorum functionis enarratione proposuimus. Primo  
brachialis sinu transuersum diuides, ut ipsius tendi  
musculorum causa, quatuor digitos pollicis adducen  
subseruiem à radio liberabis, & ad tertium pollic  
uerso ligamento, ut in reliquis digitis, prius diuiso.  
flectentium superioris insertionem speculabere, qu  
dicem sustentis molitur. Atque nunc tibi in intern  
li super sunt, radium in prouum mouentes, qui qu  
nec & horum oppositos uideas, opportuniùs serua  
cubiti sedem accedas, in capotissimū obseruaturus